

เมื่อพบสัตว์สงสัยโรคปากและเท้าเปื่อยทำอย่างไร

1. ปลูกสัตว์อำเภอเข้าพื้นที่ตรวจสอบ รายงานจังหวัดทางโทรศัพท์ทันที
2. นายสัตวแพทย์ตามเข้าไปดูทันทีที่ได้รับแจ้งและเก็บตัวอย่าง (ถ้ามีรอยโรคให้เก็บรอยโรค เช่น ชิ้นเนื้อที่ปากและกีบหรือเต้านม ถ้าไม่มีรอยโรคให้เก็บ
ซีรัมตรวจ NSP หรือ RT PCR เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่โรคปากและเท้าเปื่อย รายงาน กคร.1 ภายใน 24 ชั่วโมง
3. ตั้งกักสัตว์ทั้งฝูง ประมาณ 30 วัน
4. ผล Lab ออกในวันรุ่งขึ้น
5. ถ้าผล Lab ไม่ใช่ FMD ก็แก้ปัญหาโรคอื่นต่อไป ถ้าเป็นโรค FMD ดำเนินการควบคุมโรคต่อดังนี้
 - a. ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโดยปลูกสัตว์อำเภอ
 - b. ซุกกักและทำลายสัตว์และทำลายเชื้อโรคที่ฝูงเกิดโรค ดำเนินการทำลายสัตว์ป่วยและทำฟันทายาฆ่าเชื้อที่ฟาร์มนั้น และสังเกตอาการสัตว์ร่วมฝูงทุกวัน
 - c. ซุกควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ รัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรคห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์กีบคู่ รัศมีที่ 5 – 10 กิโลเมตรเคลื่อนย้ายที่ได้แต่ต้องขออนุญาตและตรวจสอบเข้มงวด ซุกนี้จะมีการประสานด่านกักสัตว์ในพื้นที่กำหนดพิศจุดตรวจที่เหมาะสม
 - d. ซุกสอบสวนโรคและระบาดวิทยา หาสาเหตุการเกิดโรคโดย นายสัตวแพทย์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รายงาน กคร. 2 ภายใน 72 ชั่วโมง



เมื่อพบสัตว์สงสัยโรคปากและเท้าเปื่อยทำอะไร (ต่อ)

e. ชุคเฝ้าระวังโรค ชุคเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ชุคทำลายเชื้อโรค และชุคประชาสัมพันธ์ เตือนภัย อาจใช้ชุคเดียวกันได้ ชุคนี้อาจพิจารณาใช้บุคลากรจากอำเภออื่น ๆ ร่วมด้วย เนื่องจากจุดนี้ต้องแบ่งเป็น 2 Zone คือ รัศมี 1 – 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคและรัศมี 5 – 10 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการ

1. ค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มในรัศมี 5 กิโลเมตร
2. ฉีดวัคซีน ring vaccination ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค (2 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน ในสัตว์ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่สม่ำเสมอ)
3. ประชาสัมพันธ์
4. รวบรวมรายงาน กคร.4 (เก็บที่อำเภอ) ส่วน กคร.3 / กคร.5


ส่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานกรมฯ ทุกอาทิตย์จนกว่าโรคสงบ

ทั้งนี้การดำเนินการให้ดำเนินการจากด้านนอกเข้าหาจุดเกิดโรค และชุคทำลายเชื้อโรคให้จัดคนดำเนินการทำลายเชื้อโรคที่จุดเสี่ยงด้วย

f. เมื่อไม่มีสัตว์ป่วยเพิ่มให้เก็บตัวอย่างซีรัมสัตว์ร่วมฝูงหลังจากทำลายสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย 30 วัน (ถ้า NSP หรือ RT PCR เป็นบวก ให้ส่งเข้าโรงฆ่า / ถ้า NSP หรือ RT PCR เป็นลบ ให้เลี้ยงต่อไป)

** โรคสงบคือ ทำลายสัตว์ป่วยตัวสุดท้ายครบ 30 วัน (2 incubation period)

*** รายงาน กคร 6 สัปดาห์จนกว่าโรคสงบ



มาตรการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม

1. ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ เมื่อพบสัตว์สงสัยโรคปากและเท้าเปื่อยตามที่บรรยายข้างต้น และเพิ่มเติมมาตรการดังนี้
 - 1.1 เข้มงวดการเข้า – ออกฟาร์มของบุคคลหรือยานพาหนะ
 - 1.2 เน้นย้ำใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้า – ออกฟาร์มของบุคคลหรือยานพาหนะ
 - 1.3 งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือมูลสัตว์จนกว่าโรคจะสงบ หรือหากจำเป็นให้รถขนส่งสัตว์หรือมูลสัตว์จอดอยู่นอกฟาร์ม
 - 1.4 เข้มงวดการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ณ จุดรับส่งน้ำนมดิบ และรถขนส่งน้ำนมดิบ
 - 1.5 งดการนำเข้าโคนมมาเลี้ยงใหม่ในฟาร์มจนกว่าโรคจะสงบ หรือถ้าจำเป็นให้ดำเนินการแยกเลี้ยงกักโรคอย่างน้อย 21 วัน ก่อนนำเข้ารวมฝูง
 - 1.6 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบและให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1/2557 ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557
 - 1.7 หากพบสัตว์ป่วยสงสัยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท้องที่โดยด่วน หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 - 258039